

Шампунь "Веда" (педикулицидный 100мл)

Действующее вещество

Перметрин

Состав

Активное вещество - перметрин.

Фармакологическое действие

Веда оказывает противопедикулезное, инсектицидное действие. Нарушает проницаемость Na⁺-каналов мембран нервных клеток насекомых, тормозит процесс поляризации (реполяризации) нервной клетки, что приводит к парализующему эффекту. Эффективен в отношении гнид, личинок и половозрелых особей головных и лобковых вшей, блох, клещей (в т.ч. чесоточных) и др. эктопаразитов семейства членистоногих.

При однократной обработке поверхностей, пораженных педикулезом, действие Веды сохраняется от 2-3 нед до 6 нед (в зависимости от используемой лекарственной формы). В качестве противочесоточного ЛС эффективен после однократной процедуры.

Веда малотоксична для человека и при нанесении на кожу в рекомендованных дозах и концентрациях, не обладает кожно-резорбтивным, местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием.

Форма выпуска

шампунь педикулицидный

Состав

1 флакон содержит активное действующее вещество перметрин

Способ применения и дозы

Волосы обильно увлажняют раствором шампуня Веда с помощью ватного тампона, втирая в корни волос. Расход на одного человека - 10-60 мл, в зависимости от густоты и длины волос. После обработки голову покрывают косынкой, а через 40 мин препарат Веда смывают теплой проточной водой с мылом или шампунем. После мытья волосы расчесывают частым гребнем для удаления погибших насекомых. Если живые вши обнаруживаются через 7 дней после применения препарата, рекомендуется повторная обработка. В случае имеющейся опасности повторного заражения в коллективе (школа, детский сад) применять ЛС после мытья головы и оставлять его на волосах после высыхания. Нанесенный на волосы препарат Веда сохраняет свою активность приблизительно в течение 2 нед (не позволяет размножаться вновь попавшим на волосы вшам). Повторять обработку после каждого мытья волос. Погибшие гниды удаляют с волос густым гребнем или по одной, поскольку они прочно укреплены на волосах.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан в период лактации, при беременности – с осторожностью

Противопоказания

Гиперчувствительность, острые воспалительные заболевания кожи волосистой части головы.

Показания

педикулез волосистой части головы,
лобковый педикулез (в т.ч. гнидоносительство),
чесотка.

Побочные действия

аллергические реакции: кожная сыпь, отечность, местные реакции: жжение кожи, парестезии, усиление зуда, эритематозные высыпания.

Условия хранения

Препарат следует хранить в сухом защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 15 °С.

Срок годности

1,5 года.

УПАКОВКА

флакон 100 мл.