

**Паразидоз (Parasidose)**  
**Состав препарата Паразидоз**  
**Применение препарата Паразидоз**

**Владелец регистрационного удостоверения:** Laboratoires GILBERT (Франция)

**Код АТХ:** P03AC03 (Phenothrin)

**Активное вещество:** фенотрин (phenothrin) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ

**Лекарственная форма**

Паразидоз Шампунь  
рег. №: П N0467-58/40-2002 от 27.04.02 - Отмена Гос. регистрации

**Форма выпуска, упаковка и состав препарата Паразидоз**

Шампунь 0.2% 1 мл  
фенотрин 2 мг  
100 мл - флаконы пластиковые.

**Клинико-фармакологическая группа:** Препарат для лечения педикулеза

**Фармако-терапевтическая группа:** Средство уничтожения эктопаразитов

**Фармакологическое действие**

Противопедикулезное средство из группы пиретроидных инсектицидов. Оказывает нейротоксическое действие на половозрелые особи и личинки. Механизм действия связан с нарушением катионного обмена в мембранах нервных клеток насекомых.

**Показания активных веществ препарата Паразидоз**

Педикулез волосистой части головы у взрослых и детей.

**Режим дозирования**

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Применяют дважды с 24-часовым интервалом. Наносят на влажные волосы, втирают, вновь наносят, оставляют на 5 минут, затем тщательно промывают и вычесывают погибших насекомых и их личинок.

**Побочное действие**

Возможно: аллергические реакции.

**Противопоказания к применению**

Детский возраст до 2.5 лет, повышенная чувствительность к фенотрину.

**Применение у детей**

Противопоказан в детском возрасте до 2.5 лет.

**Особые указания**

Следует избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.  
Фенотрин можно также применять для дезинсекции помещений.