Применение в личном подсобном хозяйстве

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,04 мл/л воды	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – до 5 л/100 м ^{2}	1(3)	1(1)
0,04 мл/л воды	Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/10 м^2	3(2)	1(1)
0,4 мл/л воды	Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта	Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/10 м^2	3(3)	1(1)
0,16-0,24 мл/л воды	Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта	Персиковая и бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/10 м^2	3(3)	1(1)
0,16 мл/л воды	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м^2	3(2)	1(1)
0,08 мл/л воды	Смородина	Клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 1 л/куст	3(2)	1(1)
0,06 мл/л воды	Смородина	Пяденицы, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 1 л/куст	3(2)	1(1)
0,06 мл/л воды	Яблоня	Клещи, листовертки, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и формы кроны дерева)	3(2)	1(1)
0,08 мл/л воды	Яблоня	Яблонная плодожорка, совки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и формы кроны дерева)	3(1)	1(1)
0,08 мл/л воды	Цветочные культуры защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 20 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м^2	1(3)	1(1)

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,16 мл/л воды	Цветочные культуры защищенного грунта	Зеленая розанная тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-16 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м^2	1(3)	1(1)
0,32 мл/л воды	Цветочные культуры защищенного грунта	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м^2	1(3)	1(1)
0,08 мл/л воды	Комнатные растения	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 0,1-0,2 л/ м^2	-(4)	1(1)
0,08 мл/0,25 л воды	Комнатные растения	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 0,1-0,2 л/ м^2	-(4)	1(1)
0,08 мл/0,2 л воды	Комнатные растения	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 0,1-0,2 л/ м^2	-(4)	1(1)
0,08 мл/л воды	Цветочные культуры открытого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/ 100 м^2	1(4)	1(1)
0,08 мл/0,25 л воды	Цветочные культуры открытого грунта	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/ 100 м^2	1(4)	1(1)
0,08 мл/0,2 л воды	Цветочные культуры открытого грунта	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/ 100 м^2	1(4)	1(1)
0,08 мл /л воды	Груша	Листовертки, долгоносики, тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и формы кроны дерева)	3(3)	1(1)

Составители: Величко С.Н., Игнатьев П.С.