Регламенты применения
в сельском хозяйстве

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизирован-ных работ)
0,75-1	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га	28(2)	3(3)
0,75	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га	28(1)	3(3)
0,75-1	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га	28(2)	3(3)
0,8-1,2	Огурец защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ, табачный и оранжерейный трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га	3(2)	3(3)
0,8-1,2	Перец, баклажан, томат защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га	3(2)	3(3)
0,5-1,5	Цветочные культуры защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05%. Р асход рабочей жидкости – 1000-3000л/га	3(3)	3(3)
1-1,5	Цветочные культуры защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,1%. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га	3(3)	3(3)
0,5	Горшечные культуры защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ, западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации в концентрации -0,05%. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	3(3)	3(3)

Составители: Величко С.Н., Игнатьев П.С.