

## Бензилбензоат эмульсия - инструкция по применению

Регистрационный номер: P N001773/01-070907

Торговое название препарата: Бензилбензоат

Международное непатентованное название (МНН) или группировочное название: Бензилбензоат

Лекарственная форма: эмульсия для наружного применения.

### Состав

Действующее вещество: бензилбензоат – 200 мг.

Вспомогательные вещества: мыло хозяйственное 72%, воск эмульсионный, вода очищенная до 1 г.

### Описание

однородная эмульсия белого цвета со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** противочесоточное средство.

Код АТХ P03AX01

### Фармакологические свойства

Токсически действует на различные виды клещей, в том числе на чесоточных, и проявляет антипедикулезную активность.

### Показания к применению

Бензилбензоат применяется для лечения чесотки

### Противопоказания

Гиперчувствительность. Не рекомендуется использование у детей до 3-х лет.

### Беременность и лактация

Не рекомендуется применять беременным и в период кормления грудью.

### Способ применения и дозы

Курс лечения продолжается 4 дня. Взрослым назначают 20% эмульсию, а детям до 5 лет – 10% (препарат разводят кипяченой водой в соотношении 1:1). В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Эмульсию втирают в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистое белье и одежду. На 2-й и 3-й дни делают перерыв в лечении, при этом остатки эмульсии не смывают с кожи. На 4-й день вечером больной моется с мылом и проводит втирание эмульсии, как в первый день, используя оставшуюся эмульсию, и еще раз меняет все белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов; в последующем руки обрабатывают эмульсией после каждого мытья. В случае смывания эмульсии с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Эмульсию полностью смывают с кожи на пятый день.

Лечение осложнений чесотки (дерматит, экзема, пиодермия, посткабиозная лимфопазия) должно проводиться одновременно с лечением чесотки и продолжаться после его завершения.

### Побочные эффекты

Аллергические реакции. Местные реакции: возможно (особенно у детей) ощущение жжения, раздражения кожи. При появлении признаков раздражения кожи использование препарата прекратить.

### Передозировка

Не выявлено.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

### Особые указания

Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц, должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения.

Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности и исчезает при назначении антигистаминных препаратов и мазей с глюкокортикостероидами.

Все предметы, что соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельное белье и полотенца кипятят в растворе стирального порошка в течение 5-10 минут.

Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешиваются на открытый воздух на 3 дня.

Обувь, игрушки и прочие предметы помещают в целлофановый пакет и исключают из пользования на 5 дней. Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из использования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции. Мягкую мебель можно обработать препаратами для дезинсекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств.

Необходимо избегать попадания препарата в глаза, нос, рот.

### При попадании препарата:

– в рот и нос: прополоскать обильно водой или 2% раствором теплой питьевой соды;

– в глаза: тщательно промыть водой.

### Форма выпуска

Эмульсия для наружного применения 20% во флаконах и бутылках по 50 г, 100 г и 200 г. Каждый флакон, бутылку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

### Условия хранения

При температуре от 18 до 22°C. В недоступном для детей месте.

### Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

### Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

### Производитель

ЗАО "Ретиноиды"