

Описание лекарственного препарата Бензилбензоат (Benzylbenzoate)

Владелец регистрационного удостоверения:

АЛТАЙВИТАМИНЫ, ЗАО (Россия)

Код АТХ: P03AX01 (Benzyl benzoate)

Активное вещество: бензилбензоат (benzyl benzoate)

Ph.Eur. Европейская Фармакопея

Лекарственная форма

Препарат разрешен к применению в качестве средств безрецептурного отпуска Бензилбензоат

Мазь д/наружн. прим. 20%: тубы 25 г или 30 г

рег. №: ЛП-000386 от 25.02.11 - Бессрочно

Дата перерегистрации: 09.06.16

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Бензилбензоат

Мазь для наружного применения 10% 1 г

бензилбензоат 100 мг

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Мазь для наружного применения 20% 1 г

бензилбензоат 200 мг

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Препарат для лечения чесотки

Фармако-терапевтическая группа: Противочесоточное средство

Фармакологическое действие

Противочесоточный препарат для наружного применения.

Оказывает токсическое действие в отношении чесоточного клеща. Вызывает гибель личинок и взрослых особей чесоточных клещей; не действует на их яйца.

Фармакокинетика

Проникает в верхние слои эпидермиса, не всасывается в системный кровоток.

Показания препарата Бензилбензоат

Чесотка.

Режим дозирования

Наружно. Взрослым назначают 20% мазь, а детям с 3-х лет - 10%. Мазь наносят после мытья на ночь на весь кожный покров, исключая лицо и волосистую часть головы, втирают руками, которые не моют до утра, на одно втирание расходуется 30-40 г мази. На четвертый день обработку повторяют, на пятый день назначают мытье со сменой нательного и постельного белья.

Побочное действие

Местные реакции: возможно (особенно у детей) ощущение жжения, раздражение кожи, аллергические реакции.

Противопоказания к применению

Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан: беременность, период лактации.

Применение у детей

Противопоказан: детский возраст (до 3 лет).

Особые указания

Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц, должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения. Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности и исчезает при назначении антигистаминных препаратов и мазей с глюкокортикостероидами. После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений и более длительное время. Все предметы, которые соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельные принадлежности, белье, полотенца кипятят в растворе стирального порошка в течение 5-10 минут. Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешиваются на открытый воздух на 3 дня. Обувь, игрушки и прочие предметы исключают из пользования на 5 дней и помещают в целлофановый пакет. Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из пользования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции. Мягкую мебель можно обрабатывать препаратами для дезинсекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств. Необходимо избегать попадания препарата в глаза, полость носа и полость рта.

При попадании препарата:

в полость носа: полость носа обильно промыть водой;

в полость рта: полость рта прополоскать обильно водой или 2% теплым раствором натрия гидрокарбоната (питьевой соды);

в желудок: желудок промыть 1-2% раствором натрия гидрокарбоната, водной смесью жженой магнезии (по 1-2 столовой ложке на стакан воды) и активированного угля;

в глаза: глаза тщательно промыть водой или 1-2% раствором натрия гидрокарбоната.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов. Не оказывает.

Передозировка

Не выявлено.

Лекарственное взаимодействие

Фармакологического взаимодействия мази с другими препаратами не выявлено, однако, как и все противопаразитарные средства, ее не рекомендуется применять одновременно с другими наружными лекарственными средствами.

Условия хранения препарата Бензилбензоат

В защищенном от света месте, при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Бензилбензоат

Срок годности. 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия реализации

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.