

Борная кислота
Инструкция по медицинскому применению - РУ № Р N003797/01

Дата последнего изменения: **16.10.2009**

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения (спиртовой)

Состав

Кислоты борной 30 г

Спирта этилового 70% до 1000 мл

Описание лекарственной формы

Бесцветная прозрачная жидкость со спиртовым запахом.

Фармакологическая группа

Антисептическое средство

Фармакологические (иммунобиологические) свойства

Антисептическое средство.

Показания

Раствор кислоты борной применяют в отоларингологии при наружных острых и хронических отитах без повреждения барабанной перепонки.

Противопоказания

Нарушение функции почек, детский возраст, беременность, индивидуальная непереносимость, нарушение целостности барабанной перепонки.

Способ применения и дозы

Растворы закапывают в ухо по 3-5 капель 2-3 раза в день или вводят турунды, смоченные раствором, в слуховой канал.

Побочные действия

При использовании кислоты борной, особенно при передозировке и длительном применении и при нарушениях функции почек, возможно возникновение острых и хронических токсических реакций: тошноты, рвоты, диареи, кожной сыпи.

Форма выпуска

3% раствор для наружного применения (спиртовой) во флаконах из стекломассы по 10, 25 и 40 мл, во флаконах-капельницах по 10, 15, 25 мл, во флаконах из трубки стеклянной по 10 мл. Каждый флакон помещен в пачку из картона.

Условия хранения

При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.