

Ихтиол
Инструкция по медицинскому применению - РУ № ЛП-003531

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Состав

Состав на один суппозиторий:

Действующее вещество:

Ихтиол (ихтаммол) – 0,2 г.

Вспомогательные вещества:

Вода очищенная – 0,038 г, Эмульгатор «Твердый-2» (Т-2) – 0,05 г.

Основа для суппозиториев

Жир твердый (Витепсол (марки Н 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50)) – до получения суппозитория массой 1,23 г.

Описание лекарственной формы

Суппозитории темно-коричневого цвета с характерным запахом, торпедообразной формы, с максимальным диаметром 1,2 см

Фармакологическая группа

Противовоспалительное средство для местного применения

Фармакологические (иммунобиологические) свойства

Противовоспалительное средство, оказывает местнообезболивающее, антисептическое действие.

Противовоспалительное действие связано с ингибированием высвобождения медиаторов воспаления.

При ректальном введении препарат оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки, вследствие чего рефлекторно усиливается кровообращение в органах малого таза, улучшается обмен веществ, что способствует устранению воспаления в предстательной железе у мужчин, яичниках, маточных трубах, матке у женщин.

Показания

Сальпингоофорит, эндометрит, простатит в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период лактации препарат применяют с осторожностью, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Ректально: по 1 суппозиторию 1–2 раза в день после очистительной клизмы или самопроизвольного очищения кишечника. Длительность курса лечения определяется лечащим врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие

Несовместим в растворах с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов.

Особые указания

Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не изучалось.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 200 мг. По 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 12 до 15 °С.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.