

АЛЬКОТ ОТ ТАРАКАНОВ

Перед обработкой средством проводят уборку помещения: убирают мусор, крошки, остатки пищи, пищевые отходы и другие источники корма тараканов.

Для борьбы с синантропными тараканами средство применяют, используя шприц-дозатор или тубу. Гель тонким слоем выдавливают на необработанные сухие поверхности и вводят в труднодоступные для обработок обычными средствами дезинсекции места (в щели, отверстия, за дверные коробки, плинтуса и др.), а также в места обнаружения, возможного обитания и передвижения тараканов: под раковинами, за холодильниками, около вёдер, столов, около стояков и труб горячего водоснабжения и др.

При высокой численности насекомых средство наносят пунктирной линией 2 см геля – 2 см необработанной поверхности. При малой и средней численности тараканов интервал между пунктирными линиями можно увеличить до 4 см (2 см геля – 4 необработанной поверхности). При пунктирном нанесении геля одной упаковки массой 60-100 г достаточно для обработки помещения площадью 20-25 м².

Средство можно размещать на подложках по 30 мг (на 1 подложку) при малой и средней численности тараканов по 50 мг на подложку – при высокой. Раскладывать подложки следует в местах обитания и скопления тараканов из расчёта 3-4 подложки на помещение площадью 10м².

Не применять гель одновременно с обработками инсектицидами контактного действия (концентраты эмульсий, смачивающиеся порошки, дусты, средства в аэрозольной упаковке и др.)

Гибель насекомых наступает на 1-2 сутки после применения геля. Повторное применение геля рекомендуется проводить при появлении в помещении насекомых, но не ранее чем через 4 недели. Срок остаточного действия не менее 30 суток. Погибших насекомых периодически следует сметать и выбрасывать в канализацию.