

## Владелец регистрационного удостоверения:


Фармацевтическая фабрика Ижевск (Россия)

Код АТХ: D08AD (Препараты борной кислоты)

Активное вещество: борная кислота (boric acid)

Ph.Eur. Европейская Фармакопея

## Лекарственная форма



Борная  
кислота

Р-р д/местного прим. спиртовой 3%: фл. 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл или 40 мл

рег. №: ЛСР-008550/09 от 26.10.09 - *Бессрочно*

## Форма выпуска, упаковка и состав препарата Борная кислота

<b>Раствор для местного применения спиртовой 3%</b>	<b>100 мл</b>
борная кислота	3 г

10 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
15 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
20 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
40 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Антисептик для местного применения

**Фармако-терапевтическая группа:** Антисептическое средство

### Фармакологическое действие

Антисептическое средство. Обладает слабыми бактериостатическими и фунгистатическими свойствами, оказывает противопедикулезное действие.

В комбинации с оксихинолина сульфатом обладает контрацептивными свойствами.

### Показания активных веществ препарата Борная кислота

Антисептическое средство для применения в ЛОР-практике, дерматологии, офтальмологии.

Контрацепция (в комбинации с оксихинолина сульфатом).

### Режим дозирования

*Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.*

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

### Побочное действие

*Возможно:* при передозировке и длительном применении, а также при нарушении функции почек возможно возникновение острых и хронических токсических реакций (тошнота, рвота, диарея, сыпь, головная боль, спутанность сознания, судороги, олигурия, шок).

### Противопоказания к применению

Нарушения функции почек, детский возраст, обработка молочных желез (перед кормлением ребенка), беременность, повышенная чувствительность к борной кислоте.

### Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказана при беременности. Нельзя использовать для обработки молочных желез перед кормлением ребенка.

### Применение при нарушениях функции почек

Противопоказана при нарушениях функции почек.

### Применение у детей

Противопоказана в детском возрасте.

### Особые указания

Не следует наносить на обширные поверхности тела. Не применять наружно на покрытых волосами участках при острых воспалительных кожных заболеваниях.

Борную кислоту в виде конкретной лекарственной формы следует применять строго в соответствии с показаниями.